

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.26.din19.05.2022

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii:

BOLI FOLIARE IN COMPLEX(Fainare,Septorioza,Helmintosporioza,Rugini,etc.)+ PLOSNITA CEREALELOR (LARVE), GANDACUL BALOS

Care pot cauza pierderi importante la culturile: CEREALE PAIOASE (Grau,Orz,Orzoaica)

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului; 2

Septorioza



Rugina



Fainare



Plosnita cerealelor –adult-



Oua de plosnita cerealelor



Larve -stadiul I -de plosnita cerealelor

Gandacul balos. Gândacul bălos are o singură generație pe an. Adultii rod frunzele plantelor tinere, perforandu-le sub forma unor dungi longitudinale scurte, paralele cu nervurile. Larvele rod epiderma superioara și parenchimul frunzelor, tot sub forma de dungi longitudinale, iar epiderma inferioara se usuca, albindu-se. Atacul se produce în vetre și se observa de la distanță. Ataca de obicei ovazul dar și orzul și alte graminee. Tratamentele se fac la avertizare împotriva insectelor adulte, înainte de depunerea oualor. Larvele se combat când au eclozat în majoritate, în primele stadii de dezvoltare.



Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii;

Cultura prezinta atac de boli foliare:-cand se realizeaza o densitate de 3 larve de varsta a III-a/mp la graul de samanta, 5 larve de varsta a III-a/mp la graul de consum.

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

1. MYSTIC PRO/ARES PRO: 1,0 litri/ha++ VANTEX 60CS:0,08litri/ha sau
2. ORIUS 25EW/SALVATOR 25EW: 0,5litri/ha+KAISO SORBIE/REXARIS:0,15kg/ha sau
3. RIZA 250EW:0,5 litri/ha (complex de boli foliare) +LAMDEX EXTRA:0,3kg/ha sau
4. KING 250EW/TEBUSHA250EW: 0,5 litri/ha+DELTA GRI/FASTER DELTA:0,3 kg/ha sau
5. TEBUSTAR EW:0,5kg/ha (complex de boli foliare)+ MAVRIK 2F/EVURE:0,2 litri/ha sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE PE TERITORIUL ROMANIEI

Metode durabile : biologice, fizice, mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, daca acestea asigura control corespunzator organismelor daunatoare.

Perioada optima de tratament; - deschiderea ultimei teci pana la sfarsitul inspicalului

-cand majoritatea larvelor sunt de varsta a III-a.

Alte recomandari : ; Producatorii agricoli sa controleze lanurile de grau si sa efectueze tratamentul pentru combaterea plosnitei cerealelor (larve) pe suprafetele unde s-au realizat conditiile de mai sus. Luati masurile care se impun pentru protejarea coloniilor de albine. ATENTIE ! RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR", ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor inregistra in Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP- pe culturi si se vor pastra pe o perioada de cel putin 3 ani. Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania (SMR 10). Conform HG.1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8000 la 10 000 lei.

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator. Cititi cu mare atentie instructiunile de pe eticheta produsului de protectie a plantelor, inclusiv recomandările privind compatibilitatea produselor utilizate la tratamentele fitosanitare! Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator! Respectati cu strictete normele de protectie si securitate a muncii. Protejati familiile de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor conform Legii nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului nr.127/1991 al ACA din Romania, Ordinului comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentației 15b/3404/1991/ al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si Protocolului de colaborare nr. 328432/2015, incheiat cu ROMPIS privind implementarea legislatiei. Respectati prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici privind utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor. Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor si al presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare si pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

Responsabil Prognoza si Avertizare,