



Către,

### Unități Administrativ Teritoriale- TOATE

Având în vedere evoluția peștei porcine africane, se continuă seria de informare privind această boală și măsurile care trebuie aplicate pentru prevenirea răspândirii virusului. Această campanie de informare a fost inițiată de Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și Organizația Mondială pentru Sănătate Animală (OIE) sub umbrela Cadrului Global pentru Controlul Bolilor Transfrontaliere ale Animalelor (GF-TADs).

Conform Notei de Serviciu A.N.S.V.S.A. nr. 8601/ 04.07.2022, anexată la prezenta, vă solicităm să sprijiniți campania de informare prin multiplicarea și distribuirea de afișe informative astfel încât informația cuprinsă să poată fi adusă la cunoștința tuturor persoanelor interesate.

În acest sens vă transmite atașat modelul pentru afișe, format .pdf, rezoluție pentru A2.

Cu stimă,

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**Dr. Ștefan Vasile**

**Șef S.C.O.S.B.A.,**  
**Dr. Makim Adrian Liviu**

Întocmit,  
**Dr. Alexa Cătălin**






## POȚI stopa răspândirea PPA

Pesta porcină africană (PPA) este o boală virală mortală a porcilor domestici și sălbatici. Este o amenințare la adresa sănătății porcilor întrucât nu există vaccin sau tratament împotriva acesteia. PPA nu reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor dar poate duce la consecințe socio-economice catastrofale pentru sectorul de creștere al porcilor.

**Ca medic veterinar, aveți un rol crucial în protejarea producției de porci în fața acestei boli devastatoare.**

### RECUNOAȘTEREA PPA

Semnele clinice includ:



**PPA poate semăna cu:**

- Pesta porcină clasică (PPC)
- Sindromul reproductive și respirator porcin (PRRS)
- Rujet
- Salmoneloză (și alte septicemii bacteriene)
- Boala Aujeszky (sau pseudoturbarea)
- Pasteureloză
- Otrăvire
- Dermatită porcină și sindromul de nefropatie (PDNS)



### CONFIRMAȚI DIAGNOSTICUL PRIN TESTE DE LABORATOR

Probele recomandate: sânge sau ser, organe, țesuturi (splina, limfonoduri, tonsile, plămâni, rinichi și măduva osoasă).

Urmați cele mai bune practici cu probele dvs.:



Colectați-le aseptice și spălați-vă mâinile înainte și după recoltare



Manipulați atent pentru a evita degradarea, contaminarea sau vărsarea



Împachetați, sigilați, ambalați și etichetați-l conform instrucțiunilor de laborator



Expediați proba la laborator cât mai rapid posibil

### CE SĂ FACI DACĂ SUSPECTEZI SAU SE CONFIRMĂ PPA LA FERMĂ



- .... ✓ **ANUNȚĂ**  
Autoritățile sanitare veterinare naționale cât se poate de urgent



- .... ✓ **ADUNĂ**  
Informațiile epidemiologice cheie despre fermă și animale



- .... ✓ **CARANTINEAZĂ**  
Fermele suspecte sau infectate



- .... ✓ **ALERTEAZĂ**  
Fermierii învecinați



- .... ✓ **EVITĂ VIZITAREA**  
Altor ferme pentru cel puțin 48 de ore





**Acțiunile simple  
pot preveni  
PPA**

## **Pesta porcină africană (PPA) ucide porcii.**

Răspândirea acestei boli pe glob este responsabilă de pierderile masive de porci și de consecințele socio-economice dramatice. Producția de porci este esențială pentru siguranța alimentară și traiul a milioane de oameni.

**Cu toții avem rolul de a le proteja.**

# **AFLĂ CUM SE RĂSPÂNDEȘTE PPA**

**CU CÂT ȘTIM MAI MULT, CU ATÂT PUTEM OPRI RĂSPÂNDIREA.**

## **SĂNĂTATEA ta nu este amenințată de PPA**

Oamenii nu se îmbolnăvesc de PPA. Boala nu poate fi transmisă la oameni prin contactul cu porci sau consumând produse de porc.




## **Poți PURTA virusul PPA**

Virusul PPA este foarte rezistent. Îl poți purta pe haine, încălțăminte, echipament și vehicule dacă ai vizitat o zonă contaminată sau dacă aduci produse din porc.



## **Tu poți AJUTA oprirea răspândirii PPA**



- Evitați transportul produselor din carne de porc când călătoriți sau declarați-le autorităților.
- Stați departe de ferme de porci și porci mistreți
- Nu hrăniți porcii cu resturi alimentare de la bucătărie care conțin carne
- Aruncați la coșul de gunoi resturile alimentare care conțin carne de porc
- Raportați autorităților cazurile de porci bolnavi sau morți





## POȚI stopa răspândirea PPA

Pesta porcină africană (PPA) este o boală mortală a porcilor domestici și sălbatici. Nu există vreun vaccin sau vreun tratament eficient împotriva ei.

PPA nu este un pericol pentru sănătatea omului, dar este devastatoare pentru sectorul suin. Poți lua măsuri pentru a proteja porcii tăi și ai vecinilor de această boală.

### Cum să prevenim PPA

#### Implementarea măsurilor de biosecuritate



##### ✓ SEGREGARE



Construiți un adăpost care să prevină contactul cu mistreții.



Izolați porcii nou-veniți pentru cel puțin 30 de zile și urmăriți semnele clinice.



Limitați mișcarea personalului și a vizitatorilor în/din fermă.



Permiteți accesul la fermă doar vehiculelor autorizate.

##### ✓ IGIENA



Utilizați echipament dedicat doar adăpostului porcilor.



Faceți duș sau spălați mâinile cu apă și săpun înainte și după intrarea în adăpostul porcilor.



Plasați dezinfectoarele de mâini și de picioare la intrările în adăpost.



Dezinfectați toate obiectele (vehicule, echipament de lucru) cu produse autorizate.

##### ✓ FURAJREA




Dacă hrăniți porcii cu resturi, totdeauna fierbeți-le minim 30 de minute, răciți-le și administrați-le.



Asigurați porcilor apă curată.

#### CÂND SUSPECTAȚI PREZENTA PPA

Atenție la semnele clinice:



#### CE SĂ FACI ÎN CAZUL UNEI SUSPICIUNI PPA

Imediat raportați către autoritățile veterinare locale orice suspiciune a prezenței virusului PPA.

