



OFICIUL FITOSANITAR GALATI
Str.Dragos Voda nr.13 Loc GALATI
Telefon /Fax :0236/495244
e-mail :ofgalati@anf.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.9 din 19 .03.2024

Conditii climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii:

MONILIOZA (Monilinia spp), CIURUIRE (Stigmata carpophylla), BASICAREA FRUNZELOR, (TAPHRINA SPP), PATAREA ROSIE A FRUNZELOR (Polistigma rubrum), FAINARE (Podospaera L)

Care pot cauza pierderi importante la culturile: SPECII POMICOLE SAMBUROASE (piersic, nectarin, cais, cires, prun, visin) CIURUIREA (Stigmata carpophylla) este cauzata de o ciuperca microscopica care afecteaza pomii samburosi (piersic, nectarin, cais, cires, prun, visin). Imbolnavirea pe scoarta si pe lastari se produce primava sub forma unor pete brune izolate, circulare (ovale dispuse in jurul mugurilor), tesuturile afectate se rup, in urma acestora aparand fenomenul de osmoza (secretii cleioase).

Monilioza este o boala cauzata de o ciuperca microscopica, frecvent intalnita la pomii samburosi, putand produce mari pagube. Atacul de monilioza se manifesta pe ramuri, frunze, flori si fructe, primavara, cauzand arsura moniliana, iar mai apoi putrezirea fructelor.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului; 3,4

Numai unde s-au realizat urmatoarele conditii;

Temperatura aerului 2-20°C.

Monilioza prezenta miceliului de ciuperca in fructele mumificate si in scoarta ramurilor.

Ciuruire prezenta cleiului cu spori de ciuperca pe ramuri.

Folositi unul din produsele de mai jos dupa caz:

1. BOUILLIE BORDELAISE WDG -0,5% (5,0 kg/ha): (ciuruirea micotica a frunzelor si monilioza) **Sau**

2. CUPROFIX ULTRA-0,6% (6,0 kg/ha): (Ciuruirea frunzelor, basicarea frunzelor, ciuruirea bacteriana, patarea bacteriana) **Sau**

3. CUPROXAT FLOVABLE (CUPFEROL)-0,35% (3,5 litri/ha): (monilioza) **sau**

4. FYTOSAVE; 2,0 /ha (Fainare) sau

5. JAVISE50 WG/TOP SENT EXTRA: 05 kg/ha (Monilioza)

ALTE PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR OMOLOGATE PE TERITORIUL ROMANIEI

Masuri alternative de combatere: igiena culturala (igiena riguroasa a ramurilor); toamna se vor aduna si distruge fructele mumificate ramase in pomi; ramurile atacate eliminate din coroana in urma taierilor vor fi distruse, preferabil prin ardere.

Metode durabile: biologice, fizice, mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, daca acestea asigura control corespunzator organismelor daunatoare.

Perioada optima de tratament; *Tratamentul 1- dezmugurit (buton verde) la prun, cires, visin*

Tratamentul 2- in faza de buton albi infoierea corolei- la prun, cires, visin, cais

Alte recomandari: Tratamentul se va efectua pe timp linistit fara precipitatii cand temperatura aerului este pozitiva.

Intervalul minim dintre tratamente este 7 zile.

ATENTIE! RESPECTATI CONDITIILE DE DEPOZITARE, MANIPULARE SI UTILIZARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR IN EXPLOATATIILE AGRICOLE, CONFORM "GHIDULUI DE BUNE PRACTICI DE UTILIZARE SI DEPOZITARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR" ELABORAT DE AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Se recomanda a se consulta site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Toate tratamentele fitosanitare efectuate se vor inregistra in **Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP pe culturi si se vor pastra pe o perioada de cel putin 3 ani.** Aceasta cerinta este obligatorie conf. Ord 352 / 2015 privind normele de ecoconditionalitate in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania (SMR 10). Conform HG. 1230/2012 art.3 alin 2, nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art. 67, alin 1 din Reg (CE) 1107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a PPP pe care le utilizeaza se sanctioneaza cu amenda de la 8000 la 10 000 lei.

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator. Citiți cu mare atentie instructiunile de pe eticheta produsului de protectie a plantelor, inclusiv recomandările privind compatibilitatea produselor utilizate la tratamentele fitosanitare! Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător! Respectați cu strictețe normele de protecție și securitate a muncii. Protejați familiile de albine împotriva intoxicățiilor cu produse de protecție a plantelor conform Legii nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr.127/1991 al ACA din România, Ordinului comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației 15b/3404/1991/ al Departamentului pentru Administrație Locală și 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum și Protocolului de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMPIS privind implementarea legislației. Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici privind utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor. Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare. **BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

Responsabil Prognostic si Avertizare,

Ing .Huciu Maria-Angela